

# בויסטין 50 ג.ר.

## BAVISTIN 50 DF

بُستين



### קוטל פטריות סיסטמי להדברת מחלות בגידולים חקלאיים

גרגירים רכיפים

מכיל: CARBENDAZIM 50%

השאר חומרי דילול והרטבה

מסי' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 73/הגה"צ/120

**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!**  
**للاستعمال الزراعي فقط, وليس للاستعمال المنزلي!**

**מידע לרופא:** הטלפון של המרכז להרעלות בבית חולים רמבי"ם 04-8541900

מיוצר ע"י חברת BASF גרמניה



UN No. 3077

תכולה:

**1 ק"ג**



קבוצה B-1

עדכון תווית: 6/2012

מק"ט: L0014-06

משווק ע"י יצרני כימיקלים בע"מ  
אשדוד 77102, ת.ד. 262, טל. 08-8515211

[www.agan.co.il](http://www.agan.co.il)

שומשיה לפל הנריאה ג.ר. יחזק תווחת תר א.א. קל

הנריאה ג.ר. א.א. יחזק תווחת תר א.א. קל

**אזהרות:** שימוש בתכשיר לא לפי התווית או חשיפת יתר עלול לפגוע בפוריות, לנזק לעובר המתפתח או לנזק לחומר הגנטי. לא לשימוש עיניים בגיל הפוריות.

**אמצעי זהירות ומיגון:** לבש כפפות עמידות לכימיקלים ומשקפי מגן בעת הטיפול בחומר המרוכז ובריסוס. אל תאכל, אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעה ושאיפת התכשיר וממגע ישיר בעור ובעיניים.

**סכנות לסביבה:** החומר רעיל לדגים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכת טווח בסביבה המימית. מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים.

**הוראות השימוש:** ניתן להשתמש בבויסטין בגידולים בשטח הפתוח ובגידולים חסויים.

**הדברת קישיונייה גדולה:** הפטרייה פעילה במשך חודשי החורף, פוגעת בגבעולים, בעלים, בפרחים, ובפירות.

לחות גבוהה וצפיפות רבה בגידול מסייעים להתפתחות המחלה, כמו כן יש חשיבות רבה לרמת הנגיעות שהייתה בגידול הקודם.

שטח שהיה נגוע בעבר במחלה רצוי לחטא כדי לקטול את הקישיוניות בקרקע. במשך עונת הגידול ניתן למנוע את הנגיעות ע"י ריסוסים בבויסטין מהתחלת הפריחה ואילך. ניתן למנוע במידה מסוימת את חדירת הפטרייה בגבעולים ע"י הגמעת תרסיס בויסטין בקרקע ליד הצמחים.

**ציוד וכיול:** ניתן להשתמש במרסס גב המצויד בכוחש או במרסס מוטורי נגרר או מורכב על טרקטור המצויד במוט ריסוס או מפוח עם מערביל אשר יופעל במשך הכנת התרסיס ובמשך הריסוס. משתמשים בכל המערכת במסננים בני 50 שילובים (מש), לפני הריסוס מכיילים את המרסס.

**אופן הכנת התרסיס:** מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים, הפעל את הבוחש. הסר את המסנן והוסף את הכמות הדרושה של הבויסטין למכל תוך כדי בחישה. השלם את כמות המים החסרה והמשך להפעיל בחישה עד תום הריסוס.

**שילובים:** בויסטין ניתן לשילוב עם מרבית קוטלי החרקים, קוטלי האקריות וקוטלי המחלות.

אין לשלב בויסטין עם מרק בורדו ומרק קליפורני. בשילוב עם תרכיז מתחלב צריך להכניס תחילה את הבויסטין למכל המרסס ולאחר מכן להוסיף את התרכיז המתחלב. לפני ריסוס בכל שילוב צריך לבדוק בטיחות השילוב תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

הגידול	המחלה	מינון לדונם או ריכוז	מרווחי הריסוס	נפח התרסיס	טיפול אחרון לפני האסיף (ימים)
עגבנייה, פלפל, חציל	קימחונית, קישיונייה גדולה	40 גרם	אחת ל-7 ימים	50-20 לי/ד'.	7
		80 גרם	אחת ל-14 ימים	עד 100 לי/ד'.	
סלרי	כתמת (צרקוספורה), קישיונייה גדולה	40 גרם	אחת ל-7 ימים	50 לי/ד'.	7
		80 גרם	אחת ל-14 ימים		
מלפפון, קישוא, מלון	קישיונייה גדולה	40 גרם	אחת ל-7 ימים	50-20 לי/ד'.	7
		80 גרם	אחת ל-14 ימים	עד 100 לי/ד'.	
מלפפון	ריקבון הכתר בדלועיים (פוזריום)	0.2 גרם לשתיל	שבוע לאחר שתילה, אחר כך כל שבועיים	הנמעה בנפח של (0.25 לי/שתיל)	7
חסה	קישיונייה גדולה	80 גרם	אחת ל-7-14 ימים	50-30 לי/ד'.	7
תות-שדה	קימחון תות-השדה, קישיונייה גדולה	80 גרם	אחת ל-7 ימים	50-30 לי/ד'.	7
אגס	גרב האגס, במטעים בהם לא התפתחה עמידות	0.03%-0.05%	בתחילת העונה- מהלבלוב עד סוף אפריל כל 7-10 ימים. בהמשך העונה- מסוף אפריל עד סמוך לקטיף כל 10-14 ימים	200-100 לי/ד' לפי גודל ונפח העצים	7
תפוח עץ	גרב התפוח, במטעים בהם לא התפתחה עמידות	0.03%-0.05%	אחת ל-7-14 ימים מראשית הלבלוב	200-100 לי/ד' לפי גודל ונפח העצים	7
שזף, משמש, שקד	ריקבון חום (מוניליה)	0.05%	טיפול ראשון עם ראשית הפריחה והלבלוב. ריסוס שני לפי הצורך כעבור 10 ימים.	150-100 לי/ד'	
פרחים כללי	קישיונייה גדולה	40 גרם	אחת ל-7 ימים	50 לי/ד'	
		80 גרם	אחת ל-14 ימים		
		0.06%	אחת ל-10 ימים	מעל ל-100 לי/ד'	
סייפן	מגלת (פוזריום)	60 גרם	אחת ל-7 ימים	30-20 לי/ד'	

## בגמר העבודה

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בתום העבודה:** התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו. כבס בגדי עבודה בנפרד.

**כניסה לשטח המרוסס:** לאחר התייבשות התרסיס.

**אחסון:** אחסן בויסטיין במקום נעול, מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. היזהר לכל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון, מספוא ותכשירי הדברה אחרים. שמור את החומר באריזה המקורית.

**חומר שנשפך:** צריך לאסוף בעזרת מברשת ויעה לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

**השמדת אריזות:** השלך את אריזות הריקות למכל האשפה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של מגע **בחלקי גוף** גלויים צריך לרחוץ במים נקיים ובסבון. במקרה של **בליעה** פנה מיד לרופא והצג לפניו את התווית.

**מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמבי"ם **04-8541900**