

L1027046 ISRA/12U 4074591

# אופיר 2000

תחליב שמן במים

## Ofir2000<sup>EW</sup> اوفير

Emulsion Oil Water

syngenta.

### קוטל פטריות סיסטמי להדברת מחלות הקימחון והקמחונית בגידולים שונים

מכיל: 200 גרם Penconazole בליטר

**דרגת רעילות:** מסוכן (IV)  
**מס' או"ם:** 1915

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 98/הצ/1489

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

בעל הרשיון והמשווק: כצט בע"מ  
משרד ראשי: החרש 4, הוד השרון, 45240  
טלפון איש קשר: 09-7626257  
פקסי מליה: 09-7626327  
מען למכתבים: ת.ד. 10 תל-אביב 61000

**Agrica**  
כצט

Product names marked \* or ™ the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

מכיל: 1 ליטר



750ml

500ml

250ml

approx. measure

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي  
מנע מגע של ילדים עם התכשיר  
حُتَب لمس الأطفال للمنتج

סדרת ייצור:  
Batch No.

© Syngenta Crop Protection AG מיוצר ע"י: שוויץ  
במפעליה: צרפת/שוויץ  
© סימן מסחרי רשום, של חברת Syngenta Group Company, UK  
טלפון חירום של 0044-1484-538-444

S-PAC

DESCRIPTION:  
BOOKLET 4-16 PG 275 X 122 MM

SCALE:  
1:1

ISSUE NO:  
SYN001

ISSUE DATE:  
16.12.2013

4032223

Please remove before printing.  
Retirez s'il vous plaît avant l'impression  
Por favor, eliminar antes de imprimir.

### **כללי:**

אופיר 2000 הינו תכשיר להדברת מחלות לשימוש במגוון עצי פרי, ירקות ופרחים. התכשיר מכיל את החומר הפעיל פנקונזול, מדבר מחלות מקבוצת הטריאזולים (G1) המעכב סנטזת סטרולים (SBI) בפטריות. פנקונזול הינו חומר סיסטמי הנספג ע"י העלה ונע במערכת ההובלה במעלה הצמח. פנקונזול יעיל להדברת מחלות הקמחון במספר רב של גידולים.

### **הוראות שימוש:**

#### **אזהרות:**

- התכשיר מגרה עיניים ועור.
- פוגע בעובר המתפתח, לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות.
- עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

### **אמצעי זהירות ומיגון:**

יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיקר בעיניים. בזמן העבודה הימנע מאכילה, שתיה או עישון. בזמן הריסוס והטיפול בחומר חבוש כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3). הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166). לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימקלים, וכובע לכיסוי והגנה על השיער. נעל נעליים גבוהות.

### **סכנות לסביבה:**

רעיל ליצורי מים (דגים, דפניה וכו'), עלול לגרום נזק לטווח ארוך בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

### **הכנת התרסיס:**

מערבבים את הכמות הדרושה של התכשיר עם מעט מים ובוחשים היטב. את התערובת המתקבלת שופכים למיכל המרסס הממולא בחלקו במים. לאחר מכן מוסיפים את יתרת המים החסרה תוך ערבול מתמיד. במקרה של שילוב עם תכשיר נוסף יש לערבב תחילה את אופיר ת"ש.

## הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	הריכוז ב- % ריסוס לנגירה (100 ל'ד' ומעלה)	מינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'ד')	מועד אחרון לטיפול לפני האסיף או הקטיף (ימים)	הערות
מלפפון, קישוא, מלון, אבטיח	קמחון	0.035% (35 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	35	30-50 ליטר לדונם בשטח פתוח, 50-100 ליטר לדונם בחממה, כדי כיסוי מלא	3	
	קמחונית	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	50			
גזר	קמחון	-	25	30-50	3	
ורד	קמחון	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	-	-	-	
פרח השעווה	קמחונית	0.04% (40 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	40	50-100	-	
סולידגו	קמחון	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	25	50-80	-	
גיפסנית	קמחון	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	25	50-80	-	

הגידול	המחלה	הריכוז ב-% ריסוס לנגירה (100 ל'ד' ומעלה)	מינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'ד')	מועד אחרון לטיפול לפני האסיף או הקטיף (ימים)	הערות
תות שדה	קמחון	-	25	50-20	3	
מנטה	קמחון	-	25	50-20	21	
תפוח	קמחון גרב	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	-	לנגירה	14	להדברת גרב יש להוסיף מרפאן 50 בריכוז 0.1%.
מנגו	קמחון	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	-		14	טיפול ראשון ינתן עם הופעת התפרחות המיועדת לשאת פרי.
גפן	קמחון	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	-	120-50	14	
אפרסק, נקטרינה	קמחון	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	-	לנגירה	7	

למניעת התפתחות עמידות אין לטפל יותר מ-2 טיפולים ברציפות.  
במקומות בהם התפתחה עמידות חלקית או מלאה לאופיר יש לצפות כי לא תתקבל הדברה מלאה, ואין לטפל בתכשיר.

### שילובים:

**בתפוח** - ניתן לשלב עם הליוגופרית, דורסן ת"מ, מסאי א"ר, מץ' ת"מ, ספידר ת"מ ומוליט ת"ר.

**במלפפון** - ניתן לשלב עם אקרובט ג"ר, ורטימק ת"מ, טריגרד א"ר, מץ' ת"מ, רידומיל גולד MZ ג"ר ואויסקט א"מ.

**בקיטוא** - ניתן לשלב עם אקטרה.

**במלון** - ניתן לשלב עם פרוקליים ת"מ.

**בפלפל** - ניתן לשלב עם טריגרד א"ר, פרוקליים ת"מ, מץ' ת"מ, ורטימק ת"מ, מוליט ת"ר, מסאי א"ר, טרייסר אולטרה ת"מ וסקור ת"מ.

**בתות שדה** - ניתן לשלב עם מסאי א"ר, סוויץ' ג"ר, ורטימק ת"מ, פרוקליים ת"מ, מץ' ת"מ ומוליט ת"ר.

**באפרסק/נקטרינות** - ניתן לשלב עם הליוגופרית.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסנה הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

#### **עזרה ראשונה:**

- במקרה של **התזת התכשיר** הורד בגדים מזהומים, רחץ היטב את בגדיך וגופך במים ובסבון.
- במקרה של מגע התכשיר **בעיניים** יש לשטוף היטב במים, להוריד עדשות מגע ולשטוף היטב במשך 15 דקות במים זורמים.
- במקרה של **שאיפה** הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה.
- במקרה של **בליעה** או **הרעלה** יש להוציא את הנפגע לאוויר הצח, להשכיבו במקום מוצל ומאוורר. יש לדאוג לקבלת טיפול מידי ע"י רופא ולהציג בפניו תווית זו.

**מידע לרופא:** הטלפון של מרכז המידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה הוא: 04-7771900.

#### **בגמר השימוש:**

**ניקוי ציוד הריסוס:** בגמר השימוש יש לרוקן את המיכל משאריות בהתאם להנחיות סילוק תשטיפים. שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני הריסוס ואחריו. רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז של 0.05%. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות סילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. **הגנה אישית בגמר העבודה:** בגמר הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון ולהחליף בגדי עבודה. יש לכבס בנפרד בגדי עבודה. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

**כניסה מחדש (Re-Entry):** אין להיכנס לשטח המרוסס עד להתייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ומנהרות עבירות יש לאוורר היטב בשיטות המקובלות לפחות 12 שעות נוספות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

**אחסון:** אחסן את החומר באריזתו המקורית במקום **נעול**, קריר ויבש, המאושר לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממזונות האדם והחיה.

**עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה. קרא את התווית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.**

**Ofir2000<sup>®</sup>**  
Emulsion Oil Water

**אופיר**

**אופיר 2000<sup>®</sup>**  
תחליב שמן במים

**קוטל פטריות סיסטמי  
להדברת מחלות הקימחון והקמחונית בגידולים שונים**

מכיל: 200 גרם Penconazole בליטר

**דרגת רעילות: מסוכן (IV)**

**מס' או"ם: 1915**

**רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1489/הצ/98**

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי**  
**ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي**  
**מונע מגע של ילדים עם התכשיר**  
**جنب لمس الأطفال للمنتج**



בעל הרשיון והמשוק: כצט בע"מ  
משרד ראשי: החרש 4, הוד השרון, 45240  
טלפון איש קשר: 09-7626257  
פקסי מליה: 09-7626327  
מען למכתבים: ת.ד. 10 תל-אביב 61000

Product names marked \* or \*\*, the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

**מכיל: 1 ליטר**

**עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה.**  
**קרא את התווית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.**

מיוצר ע"י: שוויץ Syngenta Crop Protection AG, במפעליה: צרפת/שוויץ

© סימן מסחרי רשום, של חברת Syngenta Group Company  
טלפון חירום של Syngenta Alarm Centre in Huddersfield, UK 0044-1484-538-444

סדרת ייצור:  
Batch No.

NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.  
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.  
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.