

## בונגרו תרכיז נוזלי

**אזהרות:** התכשיר מזיק בבליעה. עלול לגרום לגירוי נשימה, עיניים ועור.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש להשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בחומרי הדברה. בעת הטיפול בתכשיר ובעת היישום יש ללבוש בגדי מגן מלאים הכוללים סרבל כותנה ארוך וכובע, ללבוש כפפות PVC ולהרכיב משקפי מגן או מגן פנים. יש להימנע מבליעה, נשימה ומגע עם העור ולא התזה לעיניים. אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

**סכנות לסביבה:** התכשיר רעיל לדגים.

**הוראות יישום:** הריסוס יעשה במרסס מפוח או רובים להרטבה טובה של הנוף. הקפד על מדידה נכונה של התכשיר. רסס בשעות הערב או הבוקר המוקדמות. אין לרסס צמחים צמאים. יש למנוע רחף לגידולים שכנים. יש לשטוף היטב את כל חלקי המרסס לאחר השימוש.

גידול	מטרה	מועד טיפול	ריכוז חומר פעיל בחלקי מילין	סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים	נפח תרסיס לדונם	הערות
אגס ספדונה	הגדלת היבול של פרי גדול	14 יום לאחר שיא הפריחה	50	125	100-150 בתוספת 0.025% טריטון x100	נפח התרסיס עפ"י גודל העצים
תפוח ריאל גאלה, סטארקינג						
אבוקדו פינקרטון	הגדלת היבול של פרי גדול	בפריחה (טיפול אחד)	50	125	100 ליטר	יש לשלב עם הטיפול במעבד יצור גיברלין "מגיק" אשר ניתן בפריחה
אבוקדו אטינגר						
אפרסמון	הגדלת היבול של פרי גדול	בין 30% ל-60% פרחים פתוחים	10	25	100-150 בתוספת 0.025% טריטון x100	נפח התרסיס עפ"י גודל העצים (1)
מנגו טומי	הגדלת היבול של פרי גדול	עד 65 יום לאחר סוף פריחה	100	250	100 ליטר	
מנגו מאיה						עד 35 יום לאחר סוף פריחה

**שילובים מותרים:** עפ"י הטבלה

(1) **תנאים בעת הריסוס:** לחות יחסית מעל 60%, ללא רוח.

# בונגרו

## תרכיז נוזלי

## BONGROW (SL)

## بونچرو

### קרא בעיון את התווית לפני השימוש

**מכיל:** 40 גרם בליטר בנזיל אדנין (6-Benzyladenine) בתמיסה המכילה חומרים אינרטיים ומשטחים.

**כללי:** "בונגרו" הנו תכשיר מווסת צמיחה המכיל ציטוקינין סינתטי המסוגל לווסת את הגידול, להביא להגדלת היבול, להגדלת הפרי, להקדמת הבשלה ולשיפור איכות הפרי.

**אזהרה:** הטיפול ב"בונגרו" בתפוח בריכוז גבוה מהמומלץ עשוי לגרום לדילול חנטים.

**רעילות:** מסוכן (דרגה IV) **מספר או"ם:** לא מסווג

**לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי**

**ليس للاستعمال المنزلي, للاستعمال الزراعي فقط !**

רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 02/ה.צ./1705/ מס' אצווה: רשום על גבי המיכל **תכולה: 1 ליטר** **תאריך עדכון התווית: 03/2016**

**בעל הרישיון והיצרן:**

## מוצרי סייפ - פק בע"מ

מאיר אסטוריה 7, חדרה טל. 073-2555666

**לתשומת לב:** היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים בעילותו אולם מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

## בונגרו תרכיז נוזלי

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות מקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** יש לשטוף היטב את הידיים במים וסבון לאחר הטיפול בחומר ולפני אכילה שתייה ועישון. בתום העבודה, יש להתרחץ היטב ולהחליף בגדי עבודה. יש לשטוף היטב הכפפות ומגן הפנים. בגדי עבודה יש לכבס בנפרד במים חמים וסבון.

**כניסה מחדש:** אין להיכנס לשטח המרוסס לפני התייבשות התרסיס.

**אחסון:** אחסון התכשיר יעשה באריזתו המקורית, במחסן נעול, קריר ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לכסות בחול כדי לספוג, לאסוף ולהשליך למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריזות ריקות:** בתהליך הכנת התרסיס, שטוף האריזות הריקות שלוש פעמים במים והוסף לתערובת. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של בליעת החומר בטעות, אין לגרום להקאה. יש לפנות מיד לרופא ולהציג לפניו תווית זו. במקרה של **מגע התכשיר בעור** יש לשטוף היטב האזור שנחשף במים חמים וסבון. במקרה של **התזה לעיניים**, יש לשטוף בזרם חלש של מים נקיים, לפחות 15 דקות. פנה לרופא והצג בפניו תווית זו.

**מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם 04-8541900